

- HBs antigen blijft aanwezig en
- het HBV-DNA gehalte bedraagt IU/ml. Dit is minder dan 2.000 IU/ml. Ik engageer me de behandeling met ZEFFIX te stoppen indien de viremie stijgt boven de 2.000 IU/ml of bij verslechtering van het histologisch beeld en
- HBe antigen was aanwezig bij aanvang. Bij recente controle blijft het HBe antigeen aanwezig en ik engageer me de behandeling met ZEFFIX te stoppen bij HBe seroconversie aangetoond door 2 biologische onderzoeken uitgevoerd met minstens 6 maanden tussentijd of
- HBe antigen was afwezig bij aanvang. Ik engageer me de behandeling met ZEFFIX te stoppen bij HBs seroconversie aangetoond door 2 biologische onderzoeken uitgevoerd met minstens 6 maanden tussentijd

mogelijkheid 2 (§ 2000200): alle voorwaarden zijn aanwezig:

- bijzondere situatie van
 - status na orgaantransplantatie of op de wachtlijst
 - of status na beenmergtransplantatie of op de wachtlijst
 - of histologisch bewezen cirrose
- en
- HBV-DNA gehalte bedroeg recentIU/ml

Welk ook de situatie van mijn patiënt is, ik vraag de verlenging van terugbetaling van ZEFFIX aan onder de vorm van

- tabletten van 100 mg, met een maximale dosering van 1 tablet per dag
- of
- drinkbare oplossing met een maximale hoeveelheid van 16 flacons per jaar. Mijn patiënt heeft een creatinineklaring vanml/min (< 50 ml/min)

Ik bezorg desgevraagd de bewijsstukken waaruit blijkt dat mijn patiënt zich in de verklaarde toestand bevindt, aan de adviserend geneesheer.

IV - Identificatie van de arts (naam, voornaam, adres, RIZIV-nr):

..... (naam)

..... (voornaam)

..... - - (n° RIZIV)

..... / / (datum)



(stempel)

.....

(handtekening van de arts)